

治療方法

手術切除

- 切除腫瘤及附近受影響的組織。

經肝動脈栓塞化療

- 將供應營養給腫瘤的血管堵塞，令養份無法傳送至腫瘤，阻止癌腫繼續生長或將其體積縮小。

酒精注射

- 在超聲波或電腦掃描協助下，將95%濃度的酒精以幼針經皮膚直接注入腫瘤，以吸乾細胞的水分，殺死癌細胞。

射頻消融術


- 利用電子技術進行局部加熱，當溫度超過攝氏60度，便可把腫瘤組織壞死。手術可經皮膚穿刺或開腹進行。

肝臟移植

- 當肝功能已很差，無法接受其他療法時，便要考慮接受肝臟移植，但腫瘤不能大過五毫米。若腫瘤很大，癌細胞有機會已擴散，即使進行肝臟移植，日後肝癌復發的機會也很大。

預防方法

- 不要吸煙
- 節制飲酒，少飲烈酒，並避免空腹飲酒
- 保持充足休息，多吃蔬果
- 注射乙型肝炎預防疫苗
- 使用安全套
- 不要共用針筒



- 妥善儲存食物，避免進食發霉或變壞的食物
- 乙型肝炎帶病毒者需定期跟進，建議每6個月至1年接受超音波檢查和血液中的甲胎蛋白測試



何鴻燊博士醫療拓展基金會
Dr. Stanley Ho Medical Development Foundation

地址：澳門友誼大馬路555號澳門置地廣場
中國工商銀行中心九樓


電話：(853) 2878 2233

傳真：(853) 2878 1218

網址：www.drhomed.org.mo

電郵：info@drhomed.org.mo

肝癌 Liver Cancer



細菌毒素

酗酒

肝硬化


過量藥物



何鴻燊博士醫療拓展基金會
Dr. Stanley Ho Medical Development Foundation

肝癌

Liver Cancer



什麼是肝癌？

當肝臟細胞出現異變而不停分裂時，便會發展成惡性腫瘤，即是肝癌。相較其他癌症，肝癌的治療較困難，患者發現時，往往已是肝癌的中晚期。這是由於肝臟有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍可運作，所以肝癌早期病徵不明顯，故此更應及早預防。

據澳門衛生局出版的《澳門癌症登記年報2007》顯示，在癌症十大死亡原因中，肝癌分別高踞男性的第二位及女性第三位。

成因

- 肝硬化是引致肝癌的一個主要成因。肝硬化可以由很多病毒引起，其中最普遍的是乙型肝炎病毒。乙型肝炎可以直接演變成肝癌，而沒有經過肝硬化的階段。另外，丙型肝炎亦可引起肝硬化。
- 吸煙和飲酒。如果本身是乙型或丙型肝炎帶病毒者，可能會因此加快變肝癌的速度。
- 進食了含毒素如黃霉毒的食物，例如花生及穀類。
- 長期處於受某些污染物侵害的環境。



病徵

早期病徵不明顯，當患者的腫瘤逐漸增大時會出現以下徵狀：

- 上腹，尤其是右上腹感不適及腹痛
- 右肩感到疼痛，這是因為肝臟腫大，刺激到連接右肩的橫隔膜神經
- 上腹有硬塊
- 皮膚和眼白呈微黃，皮膚痕癢
- 小便呈茶色、大便呈淺灰色
- 腹部有積水



診斷方法

- 血液甲胎蛋白檢查
- 腹部超音波檢查
- 電腦掃描
- 血管造影檢查
- 磁力共振掃描
- 活組織檢查